

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Озеровой Анастасии Игоревны на тему: «Когнитивные и поведенческие расстройства в остром периоде инсульта (клинические и прогностические аспекты)», представленную на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальностям 3.1.24 – неврология, 3.1.17 – психиатрия и наркология.

Представленная работа посвящена актуальной проблеме поведенческой неврологии — феноменологии постинсультного делирия, нарушению социальных когнитивных функций и сложным аффективно-поведенческим расстройствам. Их диагностика в настоящее время затруднена из-за нехватки валидированных русскоязычных инструментов.

Вышеизложенное позволило автору определить цель исследования, которая заключается в совершенствовании подходов к ранней диагностике когнитивных и поведенческих нарушений у пациентов в остром периоде ишемического инсульта. Для достижения поставленной цели А.И. Озерова сформулировала задачи, которые были полностью реализованы. Методы исследования адекватны поставленной цели и задачам научной работы.

Достоверность диссертационного исследования, выполненного автором, обеспечивается необходимым объемом собранного и обработанного материала. Проведено расширенное клиническое исследование с анализом данных 159 пациентов (100 пациентов в основной группе и 59 в дополнительной для валидации шкалы «Индекс эмоционального поведения») и 81 участника группы контроля. Автор самостоятельно провела статистическую обработку результатов исследования, изложила и обобщила их в диссертации, сформулировала выводы и практические рекомендации.

В представленной работе получены научно значимые результаты. Установлена взаимосвязь постинсультного делирия с тяжестью ОНМК и локализацией очага в таламической области. Детализирована структура когнитивного дефицита с выделением ведущей роли нарушений памяти и регуляторных функций, а также впервые в отечественной практике дана комплексная оценка нарушений социальных когнитивных функций. Уточнена феноменология постинсультной агрессии. Особую практическую ценность имеет доказательство того, что ранняя эмоциональная лабильность является прогностическим маркером отдаленных нейропсихиатрических осложнений, а негативное влияние дефицита социальных когнитивных функций на исход лечения через 6 месяцев определяет это направление как ключевое для реабилитационных мероприятий.

### **Заключение.**

Выводы, сделанные автором, являются аргументированными, полностью соответствуют поставленной цели и задачам исследования, имеют научно-практическую значимость. Основные результаты диссертации доложены и

